

ADV "TERRA ALTA" Avís nº 11/2020

dimecres, 17 / juny / 2020

Sobre VINYA, OLIVERA i AMETLLER

Són 1 pàgines

VINYA	CUC DEL RAÏM
	<p><u>Zones primerenques de la Terra Alta: Camposines, Algars, Corbera i Pinell:</u> ens trobem a inici d'eclosió. Es recomana el tractament per a inici d'eclosió de dijous, 18 de juny, a divendres, 19 de juny.</p> <p><u>Zones mitjanes de la Terra Alta Gandesa, Bot, Batea, Vilalba i la Pobla:</u> s'ha iniciat la posta d'ous del vol de la segona generació.</p> <p><u>Zones tardanes de la Terra Alta (la Fatarella, Caseres, Horta i Arnes):</u> ens trobem a inici de vol de la segona generació.</p> <p><u>Moments de tractament i productes:</u> <u>Inici de vol:</u> Fenoxicarb <u>Període de posta d'ous sense iniciar l'eclosió:</u> Indoxacarb i Clorantraniliprol. <u>Inici d'eclosió:</u> Bacillus thuringiensis (BELTHIRUL), Spinosad (SPINTOR 480 SC), Spinetoram (RADIANT) i Tebufenocide.</p>
	CENDROSA
	El tercer tractament es realitzarà així que el raïm vagi agafant la mida de gra de pèsol.
	MÍLDIU
	<p>Amb les condicions meteorològiques dels darrers dies s'observen noves afectacions. Es recomana a tots els viticultors que tinguin constància en la protecció de les vinyes vigilant les afectacions en fulles i raïms. En vinyes amb agricultura ecològica cal que estiguin protegides.</p> <p>És molt important renovar la protecció en les finques on apareixen taques i raïms afectats a mesura que s'acabi la persistència dels productes que s'han utilitzat.</p> <p>Recordem que les últimes pluges han rentat els productes de contacte.</p> <p><u>Persistència dels tractaments:</u> Contacte: persistència 7 dies. Penetrant: persistència 10 dies. Sistèmic: persistència 12 dies.</p>
OLIVERA	PRAYS
	És la plaga que ens provoca la típica caiguda de l'oliva al mes de setembre amb un orifici al pinyol. A la Terra Alta, el seu control ja s'hauria d'haver realitzat.
	PIRAL O BARRINADOR
	Si hi ha símptomes (galeries a la base de les rames de més de tres anys que ocasionen el debilitament d'aquestes) encara és el moment de fer el tractament. Cal dirigir el tractament a la fusta (punts d'inserció de rames, talls de poda, punt d'empelt, berrugues). És millor fer el tractament en pistola.
AMETLLER	PUGÓ VERD
	Cal vigilar la presència de les primeres colònies de pugons en els brots tendres.

INFORMACIÓ D'INTERÈS PER A USUARIS DEL SERVEI TÈCNIC ADV TERRA ALTA

Publicació dels avisos:

- web: <https://www.doterraalta.com/area-privada/>
- eBando: #DOTERRAALTA

Sol·licituds dels serveis i atenció tècnica personalitzada a:

Consell Regulador DO "Terra Alta"
Ctra. Vilalba, 31 ES 43780 GANDESA
T. 977421278 / info@doterraalta.cat