

# ADV "TERRA ALTA" Avís n° 18/2020

## dilluns, 27 / juliol / 2020

### Sobre VINYA, AMETLLER i OLIVERA

Són 1 pàgines

<b>VINYA</b>	<b>CUC DEL RAÏM</b>
	<p><b>Zones primerenques de la Terra Alta: Camposines, Algars, Corbera i Pinell:</b> ens trobem a inici d'eclosió. Es recomana el tractament de dimecres, 29 de juliol a divendres, 31 de juliol.</p> <p><b>Zones mitjanes de la Terra Alta Gandesa, Bot, Batea, Vilalba i la Pobla:</b> s'ha iniciat la posta d'ous del vol de la tercera generació.</p> <p><b>Zones tardanes de la Terra Alta (la Fatarella, Caseres, Horta i Arnes):</b> ens trobem a inici de vol de la tercera generació.</p> <p><b>Moments de tractament i productes:</b>  <b>Inici de vol:</b> Fenoxicarb  <b>Període de posta d'ous sense iniciar l'eclosió:</b> Indoxacarb i Clorantraniliprol.  <b>Inici d'eclosió:</b> Bacillus thuringiensis (BELTHIRUL), Spinosad (SPINTOR 480 SC), Spinetoram (RADIANT) i Tebufenocide.</p>
	<b>MÍLDIU</b>
	<p>Cal vigilar les finques amb afectacions i l'aparició de noves taques.</p>
<b>AMETLLER</b>	<b>CENDROSA</b>
	<p>S'observa incidència en algunes finques i sobretot en les varietats més sensibles. Cal estar atents per renovar la protecció si es detecta presència de la mateixa.</p> <p>S'ha de tenir en compte que les aplicacions en sofre en espolvoreig, quan les temperatures son molt elevades, poden provocar fitotoxicitat.</p>
<b>AMETLLER</b>	<b>MOSQUIT VERD</b>
	<p>Cal estar atents a l'inici dels danys als brots tendres. Vigileu les plantacions joves de menys de cinc anys.</p>
<b>OLIVERA</b>	<b>MOSCA DE L'OLIVA</b>
	<p>Estem en vol de la primera generació, els nivells de població són baixos. Tot i això, en els últims controls realitzats s'observa oliva picada en varietats d'oliva grossa. De manera que es recomana realitzar un tractament a tot l'arbre amb un producte larvicida a les varietats primerenques d'oliva grossa, Empeltre, Farga, Gordal, Sevillenc, Fulla de Salze, etc,</p> <p>Si s'utilitza la captura massiva per al control d'aquesta plaga, ja es va recomanar col·locar els mosquers amb anterioritat. També, si es realitza el tractament amb esquer o s'utilitza el caolí com a repel·lent de picada, ja es va recomanar aplicar aquests productes en varietats d'oliva grossa.</p> <p>Pel que fa a l'oliva arbequina encara no s'ha detectat oliva picada i per tant no es recomana realitzar cap tipus de tractament.</p> <p>Recordem que aquesta campanya <b>NO es pot utilitzar el Dimetoat.</b></p>

#### INFORMACIÓ D'INTERÈS PER A USUARIS DEL SERVEI TÈCNIC ADV TERRA ALTA

**Publicació dels avisos:**

- web: <https://www.doterraalta.com/area-privada/>
- eBando: #DOTERRAALTA

**Sol·licituds dels serveis i atenció tècnica personalitzada a:**

Consell Regulador DO "Terra Alta"  
Ctra. Vilalba, 31 ES 43780 GANDESA  
T. 977421278 / [info@doterraalta.cat](mailto:info@doterraalta.cat)