

ADV "TERRA ALTA" Avís nº 03/2021

dimarts, 9 / febrer / 2021

Sobre VINYA, OLIVERA i AMETLLER

Són 1 pàgines

VINYA	CONFUSIÓ SEXUAL
	Durant l'època de poda és un bon moment per retirar els difusors de confusió sexual i així no es deixen residus a la parcel·la. Podeu consultar al vostre distribuïdor per saber on s'han de dipositar els difusors recollits.
OLIVERA	MALALTIES DE FUSTA
	<p>Les ferides produïdes durant la poda és per on accedeixen els fongs que causen les malalties de fusta. Actualment no existeixen mitjans de lluita curatius, pel qual son d'especial importància les mesures preventives següents:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Recordem podar aviat les vinyes més afectades i desinfectar les tisores utilitzades. • Eliminar i destruir els braços i els ceps morts. • Fer una poda racional, minimitzant en la mesura del possible la realització de ferides grosses. • Evitar períodes plujosos o humits per realitzar la poda. • En el cas de fer pre poda, picar la fusta el més petita possible i incorporar-la al terra. • Aplicar algun protector o màstic sobre les ferides de poda.
AMETLLER	CORC DE L'OLIVERA
	<p>Per tal d'evitar possibles afectacions d'aquesta plaga, és recomanable que quan hagin finalitzat les feines de tallar les branques trencades i la poda, es realitzi una trituració o un picat fi (< 10 cm) d'aquestes o la seva crema en el mateix camp, i la llenya s'emmagatzemi en llocs tancats preferentment fora dels camps d'olivera.</p> <p>Més informació: http://agricultura.gencat.cat/web/.content/ag_agricultura/ag02_sanitat_vegetal/ag02_02_plagues/documents_plagues/fitxers_estatics/fitxa_72_corcs_olivera.pdf</p>
AMETLLER	ARRUFAT I PERDIGONADA: Varietats en prefloració
	Sol tenir incidència a l'inici de la brotada si durant aquesta època es produeixen períodes de pluja i molta humitat. Es recomana realitzar un tractament des de l'estadi B (borrò inflat) fins a la caiguda dels pètals. Cal mantenir protegit el cultiu si hi ha humitat.
	MONILIA: Varietats a inici de floració
AMETLLER	A les finques que presenten problemes per aquesta malaltia, cal realitzar un tractament a inici de floració. En presència d'humitats o pluges cal repetir-lo a plena floració.
	VESPETA DE L'AMETLLER
AMETLLER	S'ha detectat a Catalunya, el 2019 a Tarragona (Conca del Barberà) i a Lleida (Urgell i Garrigues). El símptoma més característic és la presència d'ametlles buides i momificades, de mida més petita, que s'ennegreixen i romanen a l'arbre després de la collita. En arribar la primavera s'observa l'orifici de sortida de l'adult. Les pèrdues poden ser elevades en varietats dolces o de closca tova. Si teniu qualsevol sospita de parcel·la afectada cal que contacteu amb l'ADV.

INFORMACIÓ D'INTERÈS PER A USUARIS DEL SERVEI TÈCNIC ADV TERRA ALTA

Publicació dels avisos:

- web: <https://www.doterraalta.com/area-privada/>
- eBando: #DOTERRAALTA

Sol·licituds dels serveis i atenció tècnica personalitzada a:

Consell Regulador DO "Terra Alta"
Ctra. Vilalba, 31 ES 43780 GANDESA
T. 977421278 / info@doterraalta.cat

Informació relacionada a: Generalitat de Catalunya [Servei de Sanitat Vegetal del DAAM](#)