

ADV "TERRA ALTA" Avís n° 04/2021

divendres, 12 / març / 2021

Sobre VINYA, OLIVERA i AMETLLER
Són 1 pàgines

VINYA	<p style="text-align: center;">CONFUSIÓ SEXUAL</p> <p>A les zones primerenques de la Terra Alta encara es pot esperar una setmana a instal·lar els difusors i dos setmanes a les zones tardanes. Algunes de les recomanacions de la instal·lació dels difusors són:</p> <ul style="list-style-type: none"> - S'ha de tenir en compte les característiques de cada parcel·la per tal de col·locar els difusors i fer-ho segons les recomanacions de cada tipus de difusor i marca. - Els difusors poden resultar irritants en contacte amb les mucoses, per la qual cosa es recomana la utilització de guants. - És important que hi hagi una superfície gran de zona de confusió per obtenir millors resultats.
OLIVERA	<p style="text-align: center;">CORC DE L'OLIVERA</p> <p>Per tal d'evitar possibles afectacions d'aquesta plaga, és recomanable que quan hagin finalitzat les feines de tallar les branques trencades i la poda, es realitzi una trituració o un picat fi (< 10 cm) d'aquestes o la seva crema en el mateix camp, i la llenya s'emmagatzemi en llocs tancats preferentment fora dels camps d'olivera. Més informació:</p> <p>http://agricultura.gencat.cat/web/contenut/ag_agricultura/ag02_sanitat_vegetal/ag02_02_plagues/documents_plagues/fitxers_estatics/fitxa_72_corcs_olivera.pdf</p>
AMETLLER	<p style="text-align: center;">MONILIA: varietats en floració</p> <p>A les finques que presenten problemes per aquesta malaltia, cal realitzar un tractament a inici de floració. En presència d'humitats o pluges cal repetir-lo a plena floració.</p> <hr/> <p style="text-align: center;">PUGÓ VERD: Varietats en post-floració</p> <p>Així que les varietats més primerenques quedin lliures de les despulles florals o "collari", i es vegi l'ametlló com l'ungla, es recomana realitzar el seu control. Aprofitant aquest tractament es recomana afegir un fungicida contra arrufat i cribat.</p> <hr/> <p style="text-align: center;">VESPETA DE L'AMETLLER</p> <p>S'ha detectat a Catalunya, el 2019 a Tarragona (Conca del Barberà) i a Lleida (Urgell i Garrigues). El símptoma més característic és la presència d'ametlles buides i momificades, de mida més petita, que s'ennegreixen i romanen a l'arbre després de la collita. En arribar la primavera s'observa l'orifici de sortida de l'adult. Les pèrdues poden ser elevades en varietats dolces o de closca tova. Si teniu qualsevol sospita de parcel·la afectada cal que contacteu amb l'ADV.</p>

INFORMACIÓ D'INTERÈS PER A USUARIS DEL SERVEI TÈCNIC ADV TERRA ALTA

Publicació dels avisos:

- web: <https://www.doterraalta.com/area-privada/>
- eBando: #DOTERRAALTA

Sol·licituds dels serveis i atenció tècnica personalitzada a:

Consell Regulador DO "Terra Alta"
Ctra. Vilalba, 31 ES 43780 GANDESA
T. 977421278 / info@doterraalta.cat

Informació relacionada a: Generalitat de Catalunya [Servei de Sanitat Vegetal del DAAM](#)