

# ADV "TERRA ALTA" Avís n° 06/2021

## dimarts, 20 / abril / 2021

### Sobre VINYA, OLIVERA i AMETLLER

Són 1 pàgines

<b>VINYA</b>	<b>CUC DEL RAÏM</b>
	Els difusors per controlar la plaga s'han d'instal·lar el més aviat possible.
	<b>PRESA DE MOSTRES D'ANÀLISI AL LABORATORI DE PLANÇONS I CEPS</b>
	Aquells viticultors que vulguin realitzar anàlisi de plançons o ceps es poden posar en contacte amb el Consell Regulador, en la Unitat del DARP de Batea o amb el Servei de Sanitat Vegetal de la Ribera d'Ebre on se'ls informarà de tot el procediment per la presa de mostres.
<b>VINYA</b>	<b>CENDROSA</b>
	Tan bon punt les noves brotades tinguin uns 15 cm de brotació o bé hi hagi de 4 a 5 fulles desplegades, es recomana iniciar la seva protecció. S'ha de tenir present que per ser efectiu el sofre en pols es precisen de temperatures superiors als 18 °C.
	<b>MÍLDIU</b>
Cal estar molt atents a la possible aparició de les primeres taques i, en cas de detectar-ne, avisar immediatament a l'ADV o al Servei de Sanitat Vegetal del DARP. Com cada any es premiaran la primera i segona taca trobada sense arrencar-la del cep.	
<b>OLIVERA</b>	<b>ULL DE GALL O REPILO</b>
	Es recomana mantenir protegides les plantacions en cas de pluges o humitats altes. Mentre es vegin lesions de repilo a la vostra finca cal que repetiu el tractament cada 4-5 setmanes.
	<b>CAPARRETA NEGRA</b>
Hi ha dos moments per fer el tractament contra la caparreta (primavera i tardor). En aquests moments si tenim presència d'aquesta plaga podem fer un tractament. El producte recomanat és el piriproxifen (autoritzat només abans de floració). La plaga està en fase resistent però el piriproxifen és efectiu encara que mata la plaga per inhibició del creixement i tardarem en veure els efectes. Si a més a més tenim melassa o negrilla cal afegir caldo bordelès o sofre mullable.	
<b>AMETLLER</b>	<b>VESPETA DE L'AMETLLER</b>
	S'ha detectat a Catalunya, el 2019 a Tarragona (Conca del Barberà) i a Lleida (Urgell i Garrigues). El símptoma més característic és la presència d'ametlles buides i momificades, de mida més petita, que s'ennegreixen i romanen a l'arbre després de la collita. En arribar la primavera s'observa l'orifici de sortida de l'adult. Les pèrdues poden ser elevades en varietats dolces o de closca tova. Si teniu qualsevol sospita de parcel·la afectada cal que contacteu amb l'ADV.
	<b>TACA OCRE</b>
A les finques amb problemes durant la campanya anterior, recordem que és convenient el fer un tractament des de que el fruit és tendre fins a finals de maig.	
<b>AMETLLER</b>	<b>PUGÓ VERD</b>
	A partir d'ara cal vigilar la presència de les primeres colònies de pugons en els brots tendres.

#### INFORMACIÓ D'INTERÈS PER A USUARIS DEL SERVEI TÈCNIC ADV TERRA ALTA

##### Publicació dels avisos:

- web: <https://www.doterraalta.com/area-privada/>
- eBando: #DOTERRAALTA

##### Sol·licituds dels serveis i atenció tècnica personalitzada a:

Consell Regulador DO "Terra Alta"  
Ctra. Vilalba, 31 ES 43780 GANDESA  
T. 977421278 / [info@doterraalta.cat](mailto:info@doterraalta.cat)

Informació relacionada a: Generalitat de Catalunya [Servei de Sanitat Vegetal del DAAM](#)