

ADV "TERRA ALTA" Avís n° 10/2021

dissabte, 19 / juny / 2021

Sobre VINYA, AMETLLER i OLIVERA
Són 1 pàgines

VINYA	CUC DEL RAÏM		
	Zones primerenques de la Terra Alta: Camposines, Algars, Corbera i Pinell: S'ha iniciat la posta del vol de la segona generació.		
	Zones mitjanes de la Terra Alta Gadesa, Bot, Batea, Vilalba i la Pobla: S'ha iniciat el vol de la segona generació		
	Recordem els moments de tractament de cada producte autoritzat:		
	Moment d'aplicació	Matèria activa	Producte – Casa comercial
	Abans de l'inici del vol	(E,Z) -7,9-dodecadien-1-il- acetat (feromona líquida)*	SUBVERT - Suterra
	Inici del vol	Fenoxicarb	INSEGAR – Syngenta
	Entre inici de vol i inici d'eclosió	Clorantraniliprol	CORAGEN - FMC
		Indoxacarb	STEWARD – FMC EXPLICIT – FMC SINDOXA - Sharda
	Inici d'eclosió	Bacillus thuringiensis **	Producte comú
Spinetoram		RADIANT - Dow	
Spinosad **		SPINTOR – Dow	
Tebufenocide		MIMIC – Nisso	
MÍLDIU			
Després de les pluges importants i les humitats constants, tot i que fins ara l'afectació s'ha mantingut baixa, a partir d'ara pot començar un nou cicle de contaminacions primàries. Es recomana realitzar un tractament preventiu a la totalitat de les vinyes.			
CENDROSA			
Es detecta presència de la malaltia en alguna vinya. El tercer tractament es realitzarà així que el raïm vagi arribant a la mida de gra de pèsol			
AMETLLER	PUGÓ VERD		
	Cal vigilar la presència de les primeres colònies de pugons en els brots tendres.		
BROT SEC O FUSICOCUM			
Durant el mes de juny, si es donen períodes de pluges o mullenes, cal protegir els ametllers contra el "brot sec", especialment les finques on l'any anterior van tenir un fort atac i/o amb varietats sensibles.			

OLIVERA	PRAYS
	<p>És la plaga que ens provoca la típica caiguda d'oliva al mes de setembre amb un orifici al pinyol.</p> <p>A les zones primerenques de la Terra Alta com és el cas de Camposines i el Pinell, estem en període de posta d'aquesta generació. Es recomana el seu control amb un producte larvicida a partir d'aquest cap de setmana.</p> <p>A les zones mitjanes i tardanes de la Terra Alta, els nivells de posta comencen a ser importants, per tant, es recomana el seu control amb un producte larvicida a partir de dilluns, 21 de juny.</p>
	ULL DE GALL O REPILO
	<p>Les condicions d'humitat i temperatura actuals afavoreixen el desenvolupament del fong. En aquelles finques on s'observin afectacions a les fulles cal mantenir el cultiu protegit.</p>
	PIRAL O BARRINADOR DE LA RAMA
	<p>Si hi ha símptomes (galeries a la base de les rames de més de tres anys que ocasionen el debilitament d'aquestes) encara és el moment de fer el tractament. Cal dirigir el tractament a la fusta (punts d'inserció de rames, talls de poda, punt d'empelt, berrugues). És millor fer el tractament en pistola.</p>

INFORMACIÓ D'INTERÈS PER A USUARIS DEL SERVEI TÈCNIC ADV TERRA ALTA

Publicació dels avisos:

- web: <https://www.doterraalta.com/area-privada/>
- eBando: #DOTERRAALTA

Sol·licituds dels serveis i atenció tècnica personalitzada a:

Consell Regulador DO "Terra Alta"
Ctra. Vilalba, 31 ES 43780 GANDESA
T. 977421278 / info@doterraalta.cat

Informació relacionada a: Generalitat de Catalunya [Servei de Sanitat Vegetal del DAAM](#)