

# ADV "TERRA ALTA" Avis nº 11/2021

## dimecres, 23 / juny / 2021

Sobre VINYA, AMETLLER i OLIVERA  
Són 1 pàgines

<b>VINYA</b>	<b>CUC DEL RAÏM</b>		
	<b>Zones primerenques de la Terra Alta: Camposines, Algars, Corbera i Pinell:</b> Estem en període de posta, l'inici d'eclosió serà dissabte, 26 de juny, diumenge, 27 de juny, i dilluns, 28 de juny.		
	<b>Zones mitjanes de la Terra Alta Gandesa, Bot, Batea, Vilalba i la Pobla:</b> s'ha iniciat la posta del vol de la segona generació.		
	<b>Zones tardanes de la Terra Alta (la Fatarella, Caseres, Horta i Arnès):</b> s'ha iniciat el vol de la segona generació.		
	Recordem els moments de tractament de cada producte autoritzat:		
	<b>Moment d'aplicació</b>	<b>Matèria activa</b>	<b>Producte – Casa comercial</b>
	<b>Abans de l'inici del vol</b>	(E,Z) -7,9-dodecadien-1-il-acetat (feromona líquida)*	SUBVERT - Suterra
	<b>Inici del vol</b>	Fenoxicarb	INSEGAR – Syngenta
	<b>Entre inici de vol i inici d'eclosió</b>	Clorantraniliprol	CORAGEN - FMC
		Indoxacarb	STEWARD – FMC EXPLICIT – FMC SINDOXA - Sharda
<b>Inici d'eclosió</b>	Bacillus thuringiensis **	Producte comú	
	Spinetoram	RADIANT - Dow	
	Spinosad **	SPINTOR – Dow	
	Tebufenocide	MIMIC – Nisso	
<b>MÍLDIU</b>			
Es recomana realitzar un tractament preventiu a la totalitat de les vinyes.			
<b>CENDROSA</b>			
Es detecta presència de la malaltia en alguna vinya. El tercer tractament es realitzarà així que el raïm vagi arribant a la mida de gra de pèsol			
<b>AMETLLER</b>	<b>PUGÓ VERD</b>		
	Cal vigilar la presència de les primeres colònies de pugons en els brots tendres.		
<b>BROT SEC O FUSICOCUM</b>			
Durant el mes de juny, si es donen períodes de pluges o mullenes, cal protegir els ametllers contra el "brot sec", especialment les finques on l'any anterior van tenir un fort atac i/o amb varietats sensibles.			

<b>OLIVERA</b>	<b>PRAYS</b> És la plaga que ens provoca la típica caiguda d'oliva al mes de setembre amb un orifici al pinyol. El seu tractament ja s'hagués tingut d'enviar en anterioritat.
	<b>ULL DE GALL O REPILO</b> Les condicions d'humitat i temperatura actuals afavoreixen el desenvolupament del fong. En aquelles finques on s'observin afectacions a les fulles cal mantenir el cultiu protegit.
	<b>PIRAL O BARRINADOR DE LA RAMA</b> Si hi ha símptomes (galeries a la base de les rames de més de tres anys que ocasionen el debilitament d'aquestes) encara és el moment de fer el tractament. Cal dirigir el tractament a la fusta (punts d'inserció de rames, talls de poda, punt d'empelt, berrugues). És millor fer el tractament en pistola.

**INFORMACIÓ D'INTERÈS PER A USUARIS DEL SERVEI TÈCNIC ADV TERRA ALTA**

**Publicació dels avisos:**

- web: <https://www.doterraalta.com/area-privada/>
- eBando: #DOTERRAALTA

**Sol·licituds dels serveis i atenció tècnica personalitzada a:**

Consell Regulador DO "Terra Alta"  
Ctra. Vilalba, 31 ES 43780 GANDESA  
T. 977421278 / [info@doterraalta.cat](mailto:info@doterraalta.cat)

Informació relacionada a: Generalitat de Catalunya [Servei de Sanitat Vegetal del DAAM](#)