

ADV "DO TERRA ALTA"

AVÍS FITOSANITARI NÚM. 02/2025

Data: 1 d'abril de 2025

VINYA

Confusió sexual

A les zones primerenques i mitjanes de la comarca ja es poden començar a instal·lar els difusors per la confusió sexual. A les zones més tardanes encara es pot esperar a instal·lar-los.

Algunes de les recomanacions de la instal·lació dels difusors són:

- S'ha de tenir en compte les característiques de cada parcel·la per tal de col·locar els difusors i fer-ho segons les recomanacions de cada tipus de difusor i marca.
- Els difusors poden resultar irritants en contacte amb les mucoses, per la qual cosa es recomana la utilització de guants.
- Per obtenir millors resultats és important que hi hagi una superfície gran de zona de confusió

Cendrosa

Cal estar atents i tan bon punt les noves brotades tinguin uns 15 cm de brotació o bé hi hagi de 4 a 5 fulles desplegades, es recomana iniciar la seva protecció.

S'ha de tenir present que per ser efectiu el tractament de sofre en pols es precisen de temperatures superiors als 18 °C.

OLIVERA

Repilo

Les condicions actuals d'humitat i temperatura poden ser favorables al desenvolupament de la malaltia, es recomana protegir les plantacions i si veieu lesions de Repilo a la vostra finca cal que repetiu el tractament cada 4-5 setmanes.

Si plou més de 15 - 20 litres/m² s'ha de repetir el tractament ja que el fungicida s'haurà rentat.

Caparreta negra (*Saissetia oleae*)

Es el moment de fer el tractament de primavera per la caparreta negra.

Tractament de primavera: la plaga està en fase resistent però l'insecticida recomanat, Piriproxifen (autoritzat només abans de floració) és efectiu. Controla la plaga per inhibició del creixement i per tant tardarem en veure els efectes. Si a més a més tenim melassa o negrilla cal afegir Caldo Bordolés o Sofre mullable.

AMETLLER

Arrufat i cribat (Varietats en prefloració)

En aquelles finques en què la campanya anterior s'hagi produït una forta afectació d'arrufat o cribat, cal realitzar la protecció des de l'estadi B (borró inflat) fins a la caiguda dels pètals. Si hi ha humitat, cal mantenir protegit el cultiu.

Monilia

A les finques que presenten problemes per aquesta malaltia, cal realitzar un tractament a inici de floració. En presència d'humitats cal repetir-lo a plena floració.

INFORMACIÓ D'INTERÈS PER A USUARIS DEL SERVEI TÈCNIC ADV TERRA ALTA

Publicació dels avisos:

- web: <https://www.doterraalta.com/area-privada/>
- eBando: #DOTERRAALTA

Sol·licituds dels serveis i atenció tècnica personalitzada a:

Consell Regulador DO "Terra Alta"
Ctra. Vilalba, 31 ES 43780 GANDESA
T. 977421278 / info@doterraalta.cat

Informació relacionada a: Generalitat de Catalunya [Servei de Sanitat Vegetal del DAAC](#)

Amb el suport de:



Generalitat de Catalunya
**Departament d'Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació**