

ADV “DO TERRA ALTA”

AVÍS FITOSANITARI NÚM. 03/2025

Data: 23 d'abril de 2025

VINYA

Confusió sexual

Els difusors per controlar la plaga ja han d'estar instal·lats. Actualment hi ha diferents difusors i puffers a utilitzar, davant de qualsevol dubte amb la dosificació o col·locació, cal dirigir-se al tècnic d'ADV o a la mateixa casa subministradora.

Cendrosa

El primer tractament preventiu s'ha de fer quan les noves brotades tinguin uns 10 - 15 cm de longitud o bé hi hagi de 4 a 5 fulles desplegades.

Aquest tractament és especialment important en finques amb afectacions d'aquest fong durant la campanya passada i en aquelles zones i varietats sensibles.

Míldiu

Ja s'ha activat la xarxa antimíldiu. En vinyes en que la vegetació sigui major de 10 cm cal estar atents per si apareixen les primeres taques

Us recordem que hi ha uns premis econòmics a qui localitzi les primeres taques. Si en trobeu alguna, no l'arrenqueu del cep i aviseu immediatament a Sanitat Vegetal o al tècnic d'ADV de la zona.

No es recomana cap tractament antimíldiu, caldrà esperar a l'aparició de les primeres taques i l'evolució de la meteorologia.

OLIVERA

Repilo

Les condicions actuals d'humitat i temperatura poden ser favorables per al desenvolupament de la malaltia, es recomana protegir les plantacions i si es veuen

lesions de Repilo a la vostra finca cal que repetiu el tractament cada 4 - 5 setmanes. Si plou més de 15 - 20 litres/m² s'ha de repetir el tractament ja que el fungicida s'haurà rentat.

Caparreta negra (*Saissetia oleae*)

Tractament de primavera: la plaga està en fase resistent però l'insecticida recomanat, PIRI PROXI FEN (autoritzat només abans de floració) és efectiu. Controla la plaga per inhibició del creixement i per tant tardarem en veure els efectes. Si a més a més tenim melassa o negrilla cal afegir Caldo BORDOLÉS o Sofre mullable.

Prays

En arbres joves (1 a 5 anys) si es detecten els següents símptomes: menjada la part més tendra dels brots nous, larves de color verd de 3 a 6 mm o defecacions fosques enganxades amb fils de seda, és el moment de fer el tractament contra aquesta plaga. Per arbres en producció, els danys que ocasiona aquesta plaga en floració no justifica el tractament.

Corc de l'olivera (*Phloeotribus scarabaeoides*)

Per tal d'evitar possibles afectacions d'aquesta plaga, és recomanable que quan s'hagin finalitzat les feines de tallar les branques trencades i la poda, es realitzi una trituració o un picat fi (< 10 cm) d'aquestes o la seva destrucció en el mateix camp, i la llenya s'emmagatzemi en llocs tancats preferentment fora dels camps d'olivera.

Corc negre (*Hylesinus toranio*)

Per controlar aquesta plaga cal vigilar la presència de brancatge sec. Per reduir la població és molt important aprofitar l'esporga per destruir aquestes branques on hi viuen les larves, retirant i eliminant els brots amb símptomes, tallant 20 cm per sobre de la part afectada.

AMETLLER

Pugó verd

Cal vigilar la presència de les primeres colònies de pugons en brots tendres.

Taca ocre

A les finques amb problemes durant la campanya anterior, recordem que és convenient de fer un tractament des de que el fruit és tendre fins a finals de maig.

Brot sec

Durant aquests períodes de pluges o mullenes, cal protegir els ametllers contra el "brot sec", especialment les finques on l'any anterior van tenir un fort atac i/o amb varietats sensibles.

INFORMACIÓ D'INTERÈS PER A USUARIS DEL SERVEI TÈCNIC ADV TERRA ALTA

Publicació dels avisos:

- web: <https://www.doterraalta.com/area-privada/>
- eBando: #DOTERRAALTA

Sol·licituds dels serveis i atenció tècnica personalitzada a:

Consell Regulador DO "Terra Alta"
Ctra. Vilalba, 31 ES 43780 GANDESA
T. 977421278 / info@doterraalta.cat

Informació relacionada a: Generalitat de Catalunya [Servei de Sanitat Vegetal del DAAC](#)

Amb el suport de:



Generalitat de Catalunya
**Departament d'Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació**