

## ADV "DO TERRA ALTA"

AVÍS FITOSANITARI NÚM. 05/2025

Data: 12 de maig de 2025

### VINYA

#### Cendrosa

Per a les vinyes de brotació més tardana, es recorda que el primer tractament preventiu contra aquest fong cal realitzar-lo en el moment en que hi hagi uns 15 cm de brotació. Aquest tractament és especialment important a les vinyes que van tenir problemes l'any passat i en zones i varietats més sensibles. Petits atacs inicials en aquest moment poden multiplicar-se ràpidament més endavant. Per aquelles vinyes més avançades amb problemes habituals de cendrosa, es recomana realitzar un segon tractament preventiu entre 2 i 3 setmanes després del primer.

#### Míldiu

S'han localitzat les dos primeres taques de Míldiu a la comarca. La presència de primeres infeccions i la situació de pluges que estem tenint, fan que el risc d'atac de Míldiu sigui elevat, i es recomana mantenir les vinyes protegides, especialment les que es troben en un estat vegetatiu més avançat, ja que les previsions meteorològiques per aquesta setmana són favorables per al desenvolupament d'aquest fong.

És molt important realitzar correctament els tractaments, tractant cara per cara per assegurar-nos que es mulla bé tota la vegetació.

### OLIVERA

#### Repilo

Les condicions actuals d'humitat i temperatura poden ser favorables per al desenvolupament de la malaltia, es recomana protegir les plantacions i si es veuen lesions de Repilo a la vostra finca cal que repetiu el tractament cada 4 - 5 setmanes. Si plou més de 15 - 20 litres/m<sup>2</sup> s'ha de repetir el tractament ja que el fungicida s'haurà rentat.

#### Prays

En arbres joves (1 a 5 anys) si es detecten els següents símptomes: menjada la part més tendra dels brots nous, larves de color verd de 3 a 6 mm o defecacions fosques

enganxades amb fils de seda, és el moment de fer el tractament contra aquesta plaga. Per arbres en producció, els danys que ocasiona aquesta plaga en floració no justifica el tractament.

#### **Piral o barrinador de la rama (*Euzophera pinguis*)**

Si hi ha símptomes (galeries en la base de les rames de més de tres anys que ocasionen el debilitament d'aquestes) és el moment de fer el tractament. Cal dirigir el tractament a la fusta (punts d'inserció de rames, talls de poda, punt de l'empelt, berrugues). És millor fer el tractament amb pistola. Cal tenir especial cura als arbres que tenen berrugues degudes a Tuberculosis.

### **AMETLLER**

#### **Pugó verd**

Cal vigilar la presència de les primeres colònies de pugons en brots tendres.

#### **Taca ocre**

A les finques amb problemes durant la campanya anterior, recordem que és convenient de fer un tractament des de que el fruit és tendre fins a finals de maig.

#### **Brot sec**

Durant el mes de maig, si es donen períodes de pluges o mullenes, cal protegir els ametllers contra el "brot sec", especialment les finques on l'any anterior van tenir un fort atac i/o amb varietats sensibles.

#### **INFORMACIÓ D'INTERÈS PER A USUARIS DEL SERVEI TÈCNIC ADV TERRA ALTA**

##### **Publicació dels avisos:**

- web: <https://www.doterraalta.com/area-privada/>
- eBando: #DOTERRAALTA

##### **Sol·licituds dels serveis i atenció tècnica personalitzada a:**

Consell Regulador DO "Terra Alta"  
Ctra. Vilalba, 31 ES 43780 GANDESA  
T. 977421278 / [info@doterraalta.cat](mailto:info@doterraalta.cat)

Informació relacionada a: Generalitat de Catalunya [Servei de Sanitat Vegetal del DAAC](#)

##### **Amb el suport de:**



Generalitat de Catalunya  
**Departament d'Agricultura,  
Ramaderia, Pesca i Alimentació**