

ADV “DO TERRA ALTA”

AVÍS FITOSANITARI NÚM. 06/2025

Data: 2 de juny de 2025

VINYA

Cendrosa

Seguim recordant la importància dels tractaments preventius contra la Cendrosa per protegir la vinya durant aquest període de màxima sensibilitat.

El segon tractament contra la malaltia s'haurà de fer a inici de floració si s'utilitzen productes líquids i en plena floració si es fa amb sofre amb pols per espolvoreig.

El tercer tractament contra la malaltia es realitzarà quan el raïm vagi arribant a la mida de gra de pèsol.

Míldiu

Ja es van localitzar les primeres taques de míldiu a la comarca.

Ens trobem en un període d'extrema sensibilitat de la vinya al Míldiu i es recomana no baixar la guàrdia i seguir mantenint la protecció, especialment on hi hagi taques o repicats ja que, amb presència d'inòcul, les mullenes són suficients per expandir la malaltia.

En els casos on s'hagi constatat que no hi presència de taques, es pot esperar a repetir els tractaments.

És molt important realitzar els tractaments de manera acurada, tractant cara per cara per i dosificant correctament el producte utilitzat.

OLIVERA

Repilo

Les condicions actuals d'humitat i temperatura poden ser favorables per al desenvolupament de la malaltia, es recomana protegir les plantacions i si es veuen lesions de Repilo a la vostra finca cal que repetiu el tractament cada 4 - 5 setmanes. Si plou més de 15 - 20 litres/m² s'ha de repetir el tractament ja que el fungicida s'haurà rentat.

Prays

En arbres joves (1 a 5 anys) si es detecten els següents símptomes: menjada la part més tendra dels brots nous, larves de color verd de 3 a 6 mm o defecacions fosques enganxades amb fils de seda, és el moment de fer el tractament contra aquesta plaga. Per arbres en producció, els danys que ocasiona aquesta plaga en floració no justifica el tractament.

Piral o barrinador de la rama (*Euzophera pinguis*)

Si hi ha símptomes (galeries en la base de les rames de més de tres anys que ocasionen el debilitament d'aquestes) és el moment de fer el tractament. Cal dirigir el tractament a la fusta (punts d'inserció de rames, talls de poda, punt de l'empelt, berrugues). És millor fer el tractament amb pistola. Cal tenir especial cura als arbres que tenen berrugues degudes a Tuberculosis.

AMETLLER

Pugó verd

Cal vigilar la presència de les primeres colònies de pugons en brots tendres.

Taca ocre

A les finques amb problemes durant la campanya anterior, recordem que és convenient de fer un tractament des de que el fruit és tendre fins a finals de maig.

Brot sec

Si es donen períodes de pluges o mullenes, cal protegir els ametllers contra el "brot sec", especialment les finques on l'any anterior van tenir un fort atac i/o amb varietats sensibles.

INFORMACIÓ D'INTERÈS PER A USUARIS DEL SERVEI TÈCNIC ADV TERRA ALTA

Publicació dels avisos:

- web: <https://www.doterraalta.com/area-privada/>
- eBando: #DOTERRAALTA

Sol·licituds dels serveis i atenció tècnica personalitzada a:

Consell Regulador DO "Terra Alta"
Ctra. Vilalba, 31 ES 43780 GANDESA
T. 977421278 / info@doterraalta.cat

Informació relacionada a: Generalitat de Catalunya [Servei de Sanitat Vegetal del DAAC](#)

Amb el suport de:



Generalitat de Catalunya
**Departament d'Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació**