

ADV "DO TERRA ALTA"

AVÍS FITOSANITARI NÚM. 08/2025

Data: 11 de juny de 2025

VINYA

Cendrosa

Seguim recordant la importància dels tractaments preventius contra la Cendrosa per protegir la vinya durant aquest període de màxima sensibilitat.

El tercer tractament contra la malaltia es realitzarà quan el raïm vagi arribant a la mida de gra de pèsol.

Míldiu

Les precipitacions i les mullenes matinals fan que estigui havent noves infeccions del fong aquests dies. Cal estar atents i renovar els tractaments en aquelles vinyes on s'hagi observat presència de Míldiu actiu, ja siguin taques aïllades o repicats ja que, en presència d'inòcul, les mullenes matinals que estan havent son suficients per escampar la malaltia.

Cuc del raïm (*lobesia Botrana*)

A les zones primerenques de la Terra Alta (**Camposines, Algars, Corbera d'Ebre i Pinell de Brai**): s'ha iniciat el vol de la segona generació.

Moment d'aplicació	Matèria activa
Inici del vol	(E,Z) -7,9-dodecadien-1-il-acetat (Feromona líquida*, **)
Entre l'inici del vol i l'inici de l'eclosió	Clorantraniliprol
	Cyantraniliprol
Inici de l'eclosió	Bacillus thuringiensis **
	Spinetoram
	Spinosad**
	Tebufenocide

* Cal aplicar des de l'inici del vol de la 1a generació fins a la verema

** Autoritzat en agricultura ecològica

OLIVERA

Repilo

Les condicions actuals d'humitat i temperatura poden ser favorables per al desenvolupament de la malaltia, es recomana protegir les plantacions i si es veuen lesions a la vostra finca cal que repetiu el tractament cada 4 - 5 setmanes. Si plou més de 15 - 20 litres/m² s'ha de repetir el tractament ja que el fungicida s'haurà rentat.

Prays

És la plaga que ens provoca la típica caiguda d'oliva al mes de setembre amb un orifici al pinyol.

A les zones mitjanes i tardanes de la Terra Alta, els nivells de posta son importants i es recomana que durant la setmana es realitzi un tractament amb producte larvicida.

Piral o barrinador de la rama (*Euzophera pinguis*)

Si hi ha símptomes (galeries en la base de les rames de més de tres anys que ocasionen el debilitament d'aquestes) és el moment de fer el tractament. Cal dirigir el tractament a la fusta (punts d'inserció de rames, talls de poda, punt de l'empelt, berrugues). És millor fer el tractament amb pistola. Cal tenir especial cura als arbres que tenen berrugues degudes a Tuberculosis.

AMETLLER

Pugó verd

Cal vigilar la presència de les primeres colònies de pugons en brots tendres.

Brot sec

Si es donen períodes de pluges o mullenes, cal protegir els ametllers, especialment les finques on l'any anterior van tenir un fort atac i/o amb varietats sensibles.

INFORMACIÓ D'INTERÈS PER A USUARIS DEL SERVEI TÈCNIC ADV TERRA ALTA

Publicació dels avisos:

- web: <https://www.doterraalta.com/area-privada/>
- eBando: #DOTERRAALTA

Sol·licituds dels serveis i atenció tècnica personalitzada a:

Consell Regulador DO "Terra Alta"
Ctra. Vilalba, 31 ES 43780 GANDESA
T. 977421278 / info@doterraalta.cat

Informació relacionada a: Generalitat de Catalunya [Servei de Sanitat Vegetal del DAAC](#)

Amb el suport de:



Generalitat de Catalunya
**Departament d'Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació**