

## ADV "DO TERRA ALTA"

AVÍS FITOSANITARI NÚM. 17/2025

Data: 1 d'agost de 2025

### VINYA

#### Cendrosa

S'estan trobant afectacions puntualment importants d'aquest fong.  
En les zones i varietats on s'iniciï el verolat del raïm es el moment de realitzar el darrer tractament preventiu.  
En cas d'aplicar sofre en pols, cal tenir en compte que a partir de 32°C de temperatura es poden provocar cremades.

#### Míldiu

Es recomana estar atent i només fer el tractament si es creu oportú.

#### Cuc del raïm (*lobesia Botrana*)

A les **zones primerenques de la Terra Alta** (Camposines, Algars, Corbera d'Ebre i Pinell de Brai):  
Estem en període d'eclosió

A les **zones mitjanes de la Terra Alta** (Gandesa, Bot, Batea, Vilalba dels Arcs i La Pobla de Massaluca), es preveu inici d'eclosió per dilluns 4, dimarts 5 i dimecres 6 d'agost.

A les **zones mitjanes-tardanes de la Terra Alta** (Batea, Gandesa i Vilalba dels arcs): ens trobem en període de vol i s'ha iniciat la posta.

A les **zones Tardanes de la Terra Alta** (Horta de Sant Joan, Caseres i La Fatarella): estem en període de vol.

| Moment d'aplicació                           | Matèria activa                                               |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Inici del vol                                | (E,Z) -7,9-dodecadien-1-il-acetat<br>(Feromona líquida*, **) |
| Entre l'inici del vol i l'inici de l'eclosió | Clorantraniliprol                                            |
|                                              | Cyantraniliprol                                              |
| Inici de l'eclosió                           | Bacillus thuringiensis **                                    |
|                                              | Spinetoram                                                   |
|                                              | Spinosad**                                                   |
|                                              | Tebufenocide                                                 |

- \* Cal aplicar des de l'inici del vol de la 1a generació fins a la verema
- \*\* Autoritzat en agricultura ecològica

## Mosquit verd

S'està detectant un augment de població en determinades zones de la comarca, sobretot en zones primerenques amb alguns símptomes visibles en fulla, principalment a les puntes dels sarments.

## OLIVERA

### Mosca de l'oliva (*Bactrocera oleae*)

En les zones primerenques i d'oliva grossa es poden començar a trobar les primeres olives picades. En el cas d'utilitzar el caolí com a producte preventiu, es recomana tractar a partir del moment en que trobeu la primera oliva picada. Assegureu-vos de fer un bon recobriment de les olives.

Si s'utilitza la captura massiva per al control d'aquesta plaga es recomana col·locar els mosquers tan aviat com sigui possible a totes dues comarques.

## AMETLLER

### Mosquit verd

Cal estar atents a l'inici dels danys als brots tendres. Vigileu les plantacions joves de menys de cinc anys.

### INFORMACIÓ D'INTERÈS PER A USUARIS DEL SERVEI TÈCNIC ADV TERRA ALTA

#### Publicació dels avisos:

- web: <https://www.doterraalta.com/area-privada/>
- eBando: #DOTERRAALTA

#### Sol·licituds dels serveis i atenció tècnica personalitzada a:

Consell Regulador DO "Terra Alta"  
Ctra. Vilalba, 31 ES 43780 GANDESA  
T. 977421278 / [info@doterraalta.cat](mailto:info@doterraalta.cat)

Informació relacionada a: Generalitat de Catalunya [Servei de Sanitat Vegetal del DAAC](#)

#### Amb el suport de:



Generalitat de Catalunya  
**Departament d'Agricultura,  
Ramaderia, Pesca i Alimentació**