

ADV “DO TERRA ALTA”

AVÍS FITOSANITARI NÚM. 20/2025

Data: 12 d'agost de 2025

VINYA

Cendrosa

S'estan trobant afectacions puntualment importants d'aquest fong.
En cas d'aplicar sofre en pols, cal tenir en compte que a partir de 32°C de temperatura es poden provocar cremades.

Míldiu

S'està trobant parcel·les amb afectacions. Es recomana estar atent i només fer el tractament si es creu oportú.

Botrytis

S'està trobant parcel·les amb afectacions considerables de podridura. Per tant, si es creu oportú realitzar un tractament per tal de controlar el seu desenvolupament caldria aplicar productes fungicides i secants, tot respectant el període de seguretat per abans de la verema dels diferents productes.

Cuc del raïm (*lobesia Botrana*)

A les **zones primerenques de la Terra Alta** (Camposines, Algars, Corbera d'Ebre i Pinell de Brai): s'ha d'haver realitzat el tractament.

A les **zones mitjanes de la Terra Alta** (Gandesa, Bot, Batea, Vilalba dels Arcs i La Pobla de Massaluca), s'ha d'haver realitzat el tractament.

A les **zones mitjanes-tardanes de la Terra Alta** (Batea, Gandesa i Vilalba dels arcs): S'ha d'haver realitzat el tractament

A les **zones Tardanes de la Terra Alta** (Horta de Sant Joan, Caseres i La Fatarella): es preveu inici d'eclosió per dijous 14, divendres 15 i dissabte 16 d'agost.

Moment d'aplicació	Matèria activa
Inici del vol	(E,Z) -7,9-dodecadien-1-il-acetat (Feromona líquida*,**)
Entre l'inici del vol i l'inici de l'eclosió	Clorantraniliprol
	Cyantraniliprol
Inici de l'eclosió	Bacillus thuringiensis **
	Spinetoram
	Spinosad**
	Tebufenocide

- * Cal aplicar des de l'inici del vol de la 1a generació fins a la verema
- ** Autoritzat en agricultura ecològica

Mosquit verd

S'està detectant un augment de població en determinades zones de la comarca, sobretot en zones primerenques amb alguns símptomes visibles en fulla, principalment a les puntes dels sarments.

OLIVERA

Mosca de l'oliva (*Bactrocera oleae*)

Continuen les captures en els punts de control. Vigilar si apareixen les primeres olives picades, sobre tot en varietats primerenques (Farga, Arracada, Empeltre...) i en aquelles finques que es reguen o que tenen poca collita. En aquests casos es recomana realitzar tractaments larvicides terrestres per evitar que les picades evolucionin.

Si les olives es mantenen arrugades durant uns dies, les larves de la mosca moren de forma natural i per tant, si hi ha olives arrugades no cal tractar.

Tanmateix, tenint en compte que els atacs poden ser irregulars, es recomana fer recomptes i tractar només en el cas en que se superi el 3% d'olives amb picada recent. S'aconsella prioritzar les aplicacions amb esquer o "parcheo".

Recordeu que de forma preventiva es pot utilitzar el caolí com a repel·lent de la mosca de l'oliva. Existeixen dos formulats amb diferent número d'aplicacions.

Repilo

Cal fer el tractament si es veuen taques a les fulles i repetir-lo cada 4-5 setmanes si es continuen veient símptomes. En cas de pluges o humitats altes que afavoreixen les infeccions, cal que realitzeu un tractament preventiu. Si plou més de 15-20 litres/m² s'ha de repetir el tractament ja que el fungicida s'haurà rentat.

AMETLLER

Mosquit verd

Cal estar atents a l'inici dels danys als brots tendres. Vigileu les plantacions joves de menys de cinc anys.

INFORMACIÓ D'INTERÈS PER A USUARIS DEL SERVEI TÈCNIC ADV TERRA ALTA

Publicació dels avisos:

- web: <https://www.doterraalta.com/area-privada/>
- eBando: #DOTERRAALTA

Sol·licituds dels serveis i atenció tècnica personalitzada a:

Consell Regulador DO "Terra Alta"
Ctra. Vilalba, 31 ES 43780 GANDESA
T. 977421278 / info@doterraalta.cat

Amb el suport de:



Generalitat de Catalunya
Departament d'Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Informació relacionada a: Generalitat de Catalunya [Servei de Sanitat Vegetal del DAAC](#)